U N D E R S K O V E N

- en skov som et kunstværk på Ærø

Af billedkunstner Camilla Berner, 2025

I samarbejde med Ærø Kommune og Naturstyrelsen Fyn

Stednavne med skov

- på såvel byer, agermarker som huse

SKOVBY, Gården Skovbygade 35, i daglig tale Sognefogedens, en ældgamle bindingsværksgård hedder faktisk SKOVTOFTEGÅRD. SKOVJORDEN, ST. BIRKEMOSE

BØYELUNDS ALME (marknavn i Bregninge), EGEHOVED, EGEBJERG (NV for Bregninge), **ASKEMOSEGAARD**, **RØNNEMOSEGAARD** (begge i nærheden af Skovby), ELLEMOSE BANKE (SØ for Thorup), SKOVLANDET (v Graasten Nor)

Ærøskøbing var i ældre tid omringet af Lindeskov, heraf motivet for **byens byvåben**; på kort fra 1666 fremgik navnet **LINDTHOLTZ**– på kort fra 1734 fremgår også endnu navnet **LINDE SCHOUS AGER**, eller længere syd på LINDE SKREPPEN I STOCKEBYE SYNDER MARCK

O.S.V.

”Ærø skoves Historie” af Frits Heide

(udgivet i Tidsskrift for historisk Botanik 1918/19)

Hertug Hans den Yngre (1545 – 1622)



Valnød: Valnøddetræ i haven på Albertslykke, plantet i 1937 i forbindelse med Elsebeth Pedersens svigerforældres bryllup.





ARTLISTE _ herkomst UNDERSKOVEN 2025

Elm, storbladet *Ulmus glabra* Elsebeth, Jørgen og Helle
Skovfyr *Pinus sylvestris* Saskia
Bøg *Fagus sylvatica* *Elsebeth, Bregnings Præstegaardshave*
Hængepil *Salix alba* Skovby gl. Skole
Lind, småbladet *Tilia cordata* Bregnings Præstegaardshave (BP)
Eg, stilk- *Quercus robur* Ole, Stærmose
Ask *Fraxinus excelsior* Skovsøen
Valnød *Juglans regia* Elsebeth, Søbygaard, Skovby
Ægte Kastanje *Castanea sativa* Kirsten og Niels-Jørgen (K /NJ)
Kræge-blommer *Prunus domestica subsp. Insititia* K /NJ
Vandgran *Metasequoia glyptostroboides*) BP
Morbær *Magnoliophyta* Dommergården
Blodbøg *Fagus sylvatica 'Riversii'* Skovby gl. Skole
Acacie *Robinia Pseudoacacia* Anne og Torben
Tempeltræ *Gingko biloba* Anne og Torben
Ærøæble *Malus x* Pometet
Ærøpære 'Langpæren' *Pyrus x* K/NJ m.fl
Rødel *Alnus glutinosa* Pippiehuset
Gråpoppel 'Abil' (sølvpoppel x bævreasp) *Populus x canescens* *bryn*

Birk, vorte- *Betula pendula* Ole
Hyld *Sambucus nigra* E, Borgnæs
Seljerøn *Sorbus intermedia* bryn
Benved *Euonymus europaeus* Skovsøen / Jakob Buhl - RELIKT
Vrietorn *Rhamnus cathartica* Steen Agersø, Jakob Buhl - RELIKT
Rød Kornel *Cornus sanguinea* Skovsøen / Jakob Buhl - RELIKT
Hassel *Corylus avellana* E, N/NJ, Egehovedskoven
Mirabel *Prunus cerasifera* Øverste Skovbymark
Slåen *Prunus spinosa* Borgnæs
Ene *Juniperus communis*
Navr *Acer campestre* Skovsøen(Jakob Buhl - RELIKT
Kirsebær Kornel *Cornus mas* K/NJ
Slyngplanter ; Vild kaprifolie, vedbend, skovranke etc
Engriflet Hvidtjørn *Crataegus monogyna* Øverste Skovbymark
Hvidtjørn *Crataegus laevigata* Skovsøen - RELIKT
Fuglekirsebær *Prunus avium* *bryn*
Fjeldribs *Ribes alpinum*
Tørst *Rhamnus frangula*
Kvalkved, Alm. *Viburnum opulus* Jakob Buhl - RELIKT
Vildrose (hunderose?) *Rosa canina* *Skovsøen(Jakob Buhl*


Hjortø By
Haven
Søby
Blodbøg
Langevrætte
Benved
Skovfyr
Valnød
Kræge
Bøg
Urehoved
Birkholm By
Skydsbæk
Vandgran
Ægte Kastanje
Eg
Bregninge
Morbær
Acacie
Ærøskøbing
Navr
Tivoli
Lind
Ommel
Vindeballe
Vrietorn
Lille Stokkeby
Olde
Kragnæs
Hassel
Store Rise
Marstal
Trøsløkke
Østermark
Lindsbjerg
Vejsnæs
582681, 6084623
2 km


1963, 6086662
200 m

Engrifet
Hvidtjørn
Skovby
29/9/25
UNDERSKOVEN

Spor af en skov der venter på at få plads....

Pollenfælder, opsat april-aug. 2025

I samarb. m.
Seniorforsker Morten F. Mortensen, Nationalmuseet

Analyse, resultat (af 4 flasker)

Ask
Fyr
Birk
Prunus sp. (kirsebær(+ fugle-), slåen ect.)
Eg
Røn
Kristtjørn
El
Tjørn
Hedelyng
Poppel
Lind

U N D E R S K O V (E N)

U N D E R S K O V E N



Profil for blandingskultur

Småbladet lind
el. Skovlind
Tilia cordata



Bevoksninger og stier

Kilde; ”Naturlig tilgroning – i nye skove, natur, og landskabsprojekter”
Af Nané Køllgaard Pedersen





Hegn og bryn
– og naboafstande

Naturlig tilgroning



Kilde; ”Naturlig tilgroning – i nye skove, natur, og landskabsprojekter”
Af Nané Køllgaard Pedersen

Eksempler på tilgroningens unge fase
De første 3 årtier

10 år
Slette med spredte buske.
Få frøkilder, et hurtigt etableret ensartet græsdække og meget hjortevildt forsinker indvandringen af træer og buske.
Højbjerg skov ved Korsør.

13 år
Pilekrat.
Hydrologien påvirker tilgroningshastigheden. Fugtige arealer koloniseres hurtigt af bl.a. pil, rødel og birk og her også mosepors.
Draved skov, Løgumkloster.

16 år
Artsrig tilgroning.
Topografisk variation understøtter den naturlige tilgroning.
Her et kuperet areal, hvor 24 forskellige arter har etableret sig på de 3,5 ha.
Hvinningdal skov, Silkeborg.

21 år
Strukturrig bevoksning.
Areal omgivet af gammel skov med mange frøkilder.
Draved skov, Løgumkloster.

28 år
Ahornbevoksning.
Ahorn er én af de 10 arter, der tilsammen dominerer den unge fase af den naturlige tilgroning. Ahorn, gråpil, eg, seljepil, tjørn, rødel, bævreasp, ask, slåen og birk dominerer typisk i de første årtier.
Suserup skov, Sorø.

Tiltag for mikroklima



MIKROKLIMAET I LANDSKABET
- OG TIDSLIGHEDEN

Kvas og sten i landskabet _ i arealer for naturlig tilgroning







Underskoven